

---

# BIO-ENTERITIDIS

VACINA CONTRA A *Salmonella* Enteritidis

Cultura de *Salmonella* Enteritidis (amostras PT4, PT4a, PT6a, PT7, PT7a e PT9) cultivadas em meio semi-sintético, inativada e micro emulsionada em adjuvante oleoso

## USO VETERINÁRIO

### INDICAÇÃO:

Aves de postura comercial e reprodutoras.

### MODO DE USAR:

Aplicar 0,5 mL por via intramuscular, no músculo do peito, com agulha 10 x 10 ou 10 x 8.

Trocar a agulha a cada 500 aves.

A idade ideal para vacinação das aves é às 12 semanas, entretanto em situações de alta contaminação pode-se vacinar de 6 a 8 semanas de idade e revaciná-las 8 semanas após, ou a critério do Médico Veterinário.

### PRECAUÇÕES

Somente vacinar aves sadias.

Não vacinar nos 21 dias que antecedem o abate.

No momento da aplicação, o produto deverá estar entre 20°C e 30°C, a fim de facilitar sua utilização.

Agitar o produto antes e durante o uso.

Após aberto o frasco, a vacina não se conserva.

Conservar o produto entre 2°C e 8°C.

Não congelar o produto.

### CONTRA- INDICAÇÕES / EFEITOS COLATERAIS

Não há, desde que administrada de acordo com as recomendações acima.

A inoculação acidental de vacina oleosa, no homem, pode causar séria reação local. O serviço médico deverá ser advertido imediatamente e informado de que se trata de vacina em emulsão oleosa.

Este ou qualquer medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não utilizar esta vacina nos estabelecimentos Avícolas classificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola como de controle permanente.

Lic. no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 7154 em 08/12/99.

Resp. Téc. Méd. Vet.

Dr. Antonio Roberto A. Corrêa

CRMV/SP 1431

Proprietário/Fabricante:

Laboratório Bio-Vet S/A

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA

---